

Don du sang : les réserves sont insuffisantes !



Don du sang : les réserves sont insuffisantes !

La période estivale est marquée par une défection des donneurs.

En cette fin de vacances, les réserves sont basses : 10 jours de sécurité au lieu des 14 requis !

1 don sauve 3 vies, alors mobilisons-nous !

Une pièce d'identité AVEC PHOTO est demandée à tous les donneurs.

Collectes de Sang en Septembre 2023 dans le GERS

VENDREDI	1	LE HOUGA	Salle H. Bouque	14 h 00 - 18 h 00
JEUDI	7	EAUZE	Salle polyvalente	11 h 00 - 17 h 30
VENDREDI	8	LASSERAN	Salle des fêtes	15 h 30 - 19 h 30
MERCREDI	20	TOURRENQUETS	Salle des fêtes	15 h 00 - 19 h 00
VENDREDI	22	LOMBEZ	Salle Ramondère	14 h 30 - 19 h 00
VENDREDI	29	MASSEUBE	Salle des fêtes	10 h 00 - 13 h 30

L'Etablissement Français du Sang préconise la prise de rendez-vous en ligne.

Pour prendre RDV c'est simple, il suffit d'aller sur <https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/> ou d'appeler le 0 800 972 100

Des créneaux horaires sont bien sûr disponibles aux donneurs se présentant spontanément sans rendez vous.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur les collectes ci-dessus, vous pouvez donner **sur le site d'Auch dans l'enceinte de l'hôpital, parking n°1 Allée Marie CLARAC**

Ouvert tous les mardis de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h et tous les jeudis de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

VOICI QUELQUES RAPPELS SUR LES CONDITIONS POUR DONNER SON SANG :

- Être âgé(e) de 18 à 70 ans
- Être muni(e) d'une pièce d'identité avec photo
- Être reconnu(e) apte au don
- Peser au moins 50 kg
- Avoir un taux d'hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué)

DANS CERTAINS CAS, IL FAUT RESPECTER UN DÉLAI AVANT DE DONNER SON SANG :

- Après la fin d'un traitement par antibiotiques : 7 jours
- Après des soins dentaires : 7 jours
- Après un épisode infectieux : 14 jours (après l'arrêt des symptômes)
- Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
- Après un voyage dans un pays où sévit le Paludisme (malaria...) : 4 mois
- Après une intervention chirurgicale : 4 mois

